

Blennorragie ou gonococcie ou « chaude pisse »

1-Définition

C'est une infection des voies urinaires, sexuellement transmissible.

2-Agent :

Neisseria gonorrhoeae: C'est une bactérie diplocoque qui se fixe surtout et se multiplie sur les organes génitaux:

- chez l'homme dans le canal urinaire
- chez la femme , il se localise dans le col de l'utérus

3- Causes

Contagion directe : Rapports sexuels non protégés

Contagion indirecte :

- Lors de l'accouchement et par utilisation des objets souillés
- Hygiène sexuelle suspicieuse

4- Symptômes et évolution de la maladie

a) Incubation

Chez les hommes : 4 à 10 jours après la contamination, les microbes se fixent dans l'urètre

Chez les femmes : illimitée, les microbes se fixent dans l'utérus

b) Éruption

Chez les hommes :

- démangeaison de l'urètre
- Douleurs à la miction

Si l'infection n'est pas soignée, les microbes atteignent les différents organes de l'appareil génital

- Écoulements verdâtre épais et abondant de pénis au réveil
- atteinte des testicules qui deviennent douloureux
- rétrécissement du canal de l'urètre
- inflammation de prostate, épидidyme, testicules
- atteinte des organes profonds(articulation, œil...)

-*Chez les femmes*

- relations sexuelles douloureuses
- Écoulements vaginaux : pertes blanches épaisses et purulentes
- douleur à la miction.

Si la maladie n'est pas soignée, les microbes se fixent sur les autres organes de l'appareil génital

- utérus → urétrite
- ovaire → ovarite
- trompe → salpingite
- uretère → urétrite

5-Traitements

La blennorragie se contracte à deux et se guérit à deux. Le traitement doit être fait par le médecin : on utilise des antibiotiques , pénicilline, streptomycine.

6- Facteurs de risques

- Multiplicité de partenaire

8-Préventions:

- Abstinence sexuelle avant le mariage ;
- Retarder l'âge du premier rapport sexuel
- Fidélité dans le couple
- Dépistage précoce au niveau des formations sanitaires ;
- Traitement adéquat des IST;
- Examen prénuptial et examen prénatal
- Éviter les tabagismes (fumeur actif et passif), les prises de drogues et les contacts avec des objets souillés
- Maintenir une alimentation saine avec de nombreux fruits et légumes

9- Conséquences

Si la blennorragie n'est pas soignée, elle peut gêner ou empêcher la grossesse conduire à la stérilité surtout chez les femmes. Les microbes peuvent se communiquer aux yeux du bébé à la naissance et peut entraîner la cécité