

## Informations essentielles pour les femmes :

- Les femmes ont le droit de décider librement en leur âme et conscience si elles désirent des enfants et à quel moment, sans aucune contrainte ni discrimination ou violence.
- Savoir comment une grossesse survient, ses signes et ses symptômes, et où se procurer un test de grossesse.
- Savoir comment éviter une grossesse non désirée, notamment où et comment obtenir des moyens contraceptifs, y compris des préservatifs.
- Savoir où et quand pouvoir bénéficier d'un avortement légal est sécurisé, et à quel prix.
- Les détails sur l'âge gestationnel limite en de ça duquel il est possible de bénéficier d'une interruption de grossesse dans un cadre légal.
- Savoir que l'avortement est une procédure médicale très sûre, mais que le risque de complications augmente avec l'âge gestationnel.
- Savoir comment reconnaître les complications d'une fausse couche et d'un avortement non sécurisé, l'importance vitale de recevoir immédiatement un traitement, et quand et où se faire soigner.

Toute femme qui opte pour un avortement devrait être informée :

- ⤴ De ce que l'on va lui faire.
- ⤴ De ce qu'elle risque de ressentir : crampe, douleur, saignement, etc.
- ⤴ De la durée de l'intervention.
- ⤴ Des risques et les complications associées à la méthode.
- ⤴ Du délai nécessaire pour reprendre les activités normales y compris les relations sexuelles.
- ⤴ Elles doivent apprendre que **l'avortement provoqué peut être mortel.**

## Types de complications post-abortives.

Les complications post abortives sont nombreuses

Complications	Symptômes	Solutions
<b>Poursuite de la grossesse</b>	Persistance des signes de grossesse ou des signes cliniques d'échec de l'interruption	Evacuation utérine aussi rapide que possible.
<b>Avortement incomplet</b>	Saignement vaginal, douleur abdominal, signe d'infection.	Traitement par aspiration et par des médicaments.
<b>Infection</b>	Fièvre, frisson, perte malodorante, douleurs abdominales et pelviennes, saignement vaginal prolongé (spotting), sensibilité utérine à la palpation, numération leucocytaire élevée.	Traitement médicamenteux à l'aide d'antibiotiques et évacuation utérine si nécessaire.
<b>Hémorragie</b>	Saignement abondant dû à un traumatisme ou à une lésion du col ou à une perforation utérine.	Evacuation utérine et médicament anti hémorragique. Transfusion sanguine.
<b>Perforation utérine</b>	Saignement	La perforation guérit d'elle-même mais il faut administrer des antibiotiques. On pratique une laparotomie si les lésions sont importantes
<b>Autres complications</b>	Empoisonnement, traumatisme abdominal, présence de corps étranger dans les voies génitales	Stabiliser puis traiter la femme selon des traitements adaptés.

## Règlementation des méthodes de contraception.

### Texte du code pénal Malagasy relatif à l'avortement.

L'avortement est très risqué car la loi est sévère : Quelle que soit la raison de l'avortement (qui peut aussi faire suite à un viol ou à un inceste), il est passible de sanction sévère pour la femme, pour le médecin et pour tout autre personne, ayant contribué de près ou de loin à cette action. La loi exige une peine, allant de 6 mois à 10 ans de prison, suivant la responsabilité des concernés, et une amende de 360 000 Ariary à 21 600 000 Ariary.