

Syphilis

1- Définition

C'est une maladie sexuellement transmissible

2- Agent

Treponema pallidum qui ne vit que dans les muqueuses génitales

3- Causes

- [syphilis acquise](#)

directe

D'homme en homme par le rapport sexuel avec un partenaire malade

Par contact avec des lésions syphilitique

indirecte

Par l'intermédiaire des objets souillés par les microbes (linge, serviette)

- [Syphilis congénitale](#)

De la mère à l'enfant durant l'accouchement

De la mère au fœtus par voie transplacentaire

4- Evolution et Symptômes de la syphilis

Incubation : 1 à 3 semaines sans manifestation qui dure 1 à 2 mois, stade contagieux

Éruption : La syphilis évolue en trois étapes :

Syphilis primaire du 1^{er} degré

Apparition

- des chancres (points rouges) sur la peau, les muqueuse, les doigts et les organes génitaux

- gonflements des ganglions durs et douloureux

S'il n'y a pas traitement, des complications apparaissent.

Syphilis secondaire du 2^{ème} degré qui dure 2 à 3 ans très contagieux

Apparition

- des taches roses ou roséoles sur la peau

- des plaques muqueuses sur les lèvres, les organes génitaux et l'anus

- des syphilides (boutons durs) sur la bouche, les mains, les plates des pieds, autour de cou formant un collier.

Le traitement peut encore arrêter la maladie

Syphilis tertiaire du 3^{ème} degré peut durer après une période de latence de 5 à 15 ans.

- Tous les organes subissent des lésions graves (la peau, les muqueuses, les os, les viscères, le système nerveux) entraînant des complications très graves

- maladie nerveuse, paralysie, perte de mémoire

- aveugle, surdité, folie, maladie cardiaque

Le traitement n'est plus efficace

5- Traitements faits par le médecin

- Pénicilline
- Bipénicilline
- Extencilline

6- Facteurs de risques

Prostitution : multiplicité de partenaire

7- Conséquences

- Avortement
- Stérilité
- Mortalité infantile

8- Préventions

- Utilisation des préservatifs
- Fidélité conjugale
- Examen prénuptial
- Examen prénatal