

# Fonctions numériques réelles : généralités

## 1. Définitions :

On appelle fonction numérique réelle toute application  $f$  d'une partie  $D$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . L'ensemble  $D$  est appelé ensemble de définition de  $f$ .  $D$  est donc l'ensemble des réels  $x$  tels que  $f(x)$  existe.

**Exemples :** Soient  $P$  et  $Q$  deux polynômes

- Si  $f(x) = P(x)$ ;  $D = \mathbb{R}$
- Si  $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ ;  $D = \{x \in \mathbb{R} / Q(x) \neq 0\}$
- Si  $f(x) = \sqrt{\frac{P(x)}{Q(x)}}$ ;  $D = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0 \text{ et } Q(x) \neq 0\right\}$
- Si  $f(x) = \frac{\sqrt{P(x)}}{\sqrt{Q(x)}}$ ;  $D = \{x \in \mathbb{R} / P(x) \geq 0, Q(x) > 0\}$
- Si  $f(x) = \sqrt{P(x)} + \sqrt{Q(x)}$ ;  $D = \{x \in \mathbb{R} / P(x) \geq 0 \text{ et } Q(x) \geq 0\}$

## 2. Opérations sur les fonctions

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions. On définit les fonctions  $f + g$ ;  $f \cdot g$ ;  $\frac{f}{g}$ ; et  $f \circ g$  par :

- $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$
- $f \circ g(x) = f[g(x)]$

## 3. Courbe représentative d'une fonction

L'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan rapporté à un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , tels que  $x \in D_f$  et  $y = f(x)$  est appelé courbe représentative de  $f$ .

On le note en général  $(C_f)$  ou  $(C)$ . Ainsi

$$C_f = \{M(x; y) / x \in D_f \text{ et } y = f(x)\} = \{M(x, f(x)) / x \in D_f\}$$

**Exemple :** Soit  $f(x) = x - \sqrt{x}$  et  $(C)$  la courbe représentative de  $f$ .

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\} = [0; +\infty[$$

Considérons les points  $M_1(0; 0)$ ,  $M_2(1; 2)$ ,  $M_3(-1; 0)$

- $f(1) = 0$  donc  $M_1 \in (C)$

- $f(1) \neq 2$  donc  $M_2 \notin (C)$
- $-1 \notin D_f$  donc  $M_3 \notin (C)$

La relation  $y = f(x)$  est appelée équation de la courbe  $(C)$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

## 4. Parité

Une fonction  $f$  est paire si quel que soit  $x \in D_f$ , on a  $-x \in D_f$  et  $f(-x) = f(x)$ .

La courbe représentative de  $f$  est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

$f$  est dite impaire si quel que soit  $x \in D_f$ ,  $-x \in D_f$  et  $f(-x) = -f(x)$

La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine  $O$  du repère.

## 5. Symétrie :

Soient  $M(x; y)$ ,  $M'(x'; y')$  deux points du plan.  $M$  et  $M'$  sont symétriques par rapport à la droite d'équation  $x = a$  si et seulement si  $y = y'$  et  $x + x' = 2a$ , donc si  $y = y'$  et  $x' = 2a - x$ .

La courbe représentative  $(C_f)$  d'une fonction  $f$  est symétrique par rapport à la droite d'équation  $x = a$  si et seulement si quel que soit  $M(x; y) \in (C_f)$ , son symétrique  $M'(2a - x; y)$  appartient aussi à  $(C_f)$

Comme  $M \in (C_f)$ , on a  $y = f(x)$ , donc  $y = f(2a - x)$  pour tout  $x \in D_f$

Ainsi :  $(C_f)$  est symétrique par rapport à la droite d'équation  $x = a$  si et seulement si quel que soit  $x \in D_f$ ,  $f(2a - x) = f(x)$ .

En remplaçant  $x$  par  $x+a$ , l'égalité s'écrit  $f(a - x) = f(a + x)$ .

### Cas particulier :

Si  $a = 0$ , on a  $f(-x) = f(x)$ , donc la fonction paire et  $(C_f)$  est symétrique, par rapport à l'axe des ordonnées (droite d'équation  $x=0$ ).

Considérons deux points  $M(x; y)$ ,  $M'(x'; y')$  et un point  $S(a; b)$

$M$  et  $M'$  sont symétriques par rapport à  $S(a, b)$  si et seulement si  $\vec{MS} = \vec{SM}'$ .

$M$  et  $M'$  sont donc symétriques par rapport à  $S(a, b)$  si et seulement si 
$$\begin{pmatrix} a - x \\ b - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' - a \\ y' - b \end{pmatrix}.$$

Donc si et seulement si 
$$\begin{cases} a - x = x' - a \\ b - y = y' - b \end{cases}, \text{ ou } \begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = 2b - y \end{cases}$$

La courbe représentative d'une fonction  $f$  est donc symétrique par rapport à  $S(a, b)$  si quel que soit  $M(x, y)$  de cette courbe, son symétrique  $M'(x'; y')$  appartient aussi à la courbe.

Donc si  $M \in (C_f)$  alors  $M' \in (C_f)$ , c'est-à-dire si  $\begin{cases} y = f(x) \\ x \in D_f \end{cases}$  alors  $\begin{cases} y' = f(x') \\ x' \in D_f \end{cases}$

Or  $y' = 2b - y$  et  $x' = 2a - x$

Ainsi

$y' = f(x')$  si et seulement si  $2b - y = f(2a - x)$

Comme  $y = f(x)$ , on a,

$(C_f)$  est symétrique par rapport à  $S(a,b)$ , si et seulement si quel que soit  $x \in D_f$ ,  $(2a - x) \in D_f$  et  $f(2a - x) + f(x) = 2b$ .

En remplaçant  $x$  par  $a+x$ , cette égalité s'écrit :  $f(a - x) + f(a + x) = 2b$ .


Si  $a = b = 0$ ,  $S \equiv 0$ , on a une fonction impaire.

## 6. Périodicité

Une fonction  $f$  est dite périodique s'il existe un réel  $p$  tel que quel que soit  $x \in D_f$ ,  $(x+p) \in D_f$  et  $f(x+p) = f(x)$ . Le plus petit réel  $p$  strictement positif vérifiant cette propriété est appelé la période de la fonction  $f$ .

On a, quel que soit  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $f(x + kp) = f(x)$

Si on a une courbe représentative de  $f$  dans un intervalle de longueur  $p$  toute la courbe est obtenue par translation de vecteur  $k \cdot p \cdot \vec{i}$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ .



## 7. Variation d'une fonction :

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ , on appelle taux de variation de  $f$  entre  $x$  et  $x'$  de  $I$ , le réel

$$\tau_{xx'} = \frac{f(x) - f(x')}{x - x'}$$

On dit que  $f$  est **croissante** (respectivement strictement croissante) sur  $I$  si quels que soient  $x$  et  $x'$  de  $I$  tels que  $x < x'$ , on a  $f(x) \leq f(x')$  (respectivement  $f(x) < f(x')$ ).

$f$  est croissante sur  $I$ , si et seulement si quels que soient  $x$  et  $x'$  de  $I$   $f_{xx}' \geq 0$ .

$f$  est strictement croissante sur  $I$ , si et seulement si quels que soient  $x$  et  $x'$  de  $I$   $f_{xx}' > 0$ .

$f$  est dite décroissante sur  $I$  si et seulement si quels que soient  $x$  et  $x'$  de  $I$  tels que  $x < x'$ , on a  $f(x) \geq f(x')$ .

$f$  est dite décroissante sur  $I$  si et seulement si quels que soient  $x$  et  $x'$  de  $I$  tels que  $x < x'$ , on a  $f(x) > f(x')$ .

$f$  est décroissante si et seulement si quels que soient  $x$  et  $x'$  de  $I$   $f_{xx}' \leq 0$ .

$f$  est strictement décroissante si et seulement si quels que soient  $x$  et  $x'$  de  $I$   $f_{xx}' < 0$ .


$f$  est dite monotone sur  $I$  si elle est soit décroissante sur  $I$ , soit croissante sur  $I$ .

Étudier les variations d'une fonction  $f$ , c'est subdiviser son domaine de définition, lorsque c'est possible, en un nombre fini d'intervalles sur chacun desquels  $f$  est monotone.

## 8. Extremum local (ou extremum relatif) :

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et  $x_0 \in I$ . On dit que :

- $f$  admet un minimum local en  $x_0$  s'il existe un intervalle ouvert  $J$  contenu dans  $I$  et contenant  $x_0$  tel que quel que soit  $x \in J$ ,  $f(x) \geq f(x_0)$ .
- $f$  admet un maximum local en  $x_0$  s'il existe un intervalle ouvert  $J$  contenu dans  $I$  et contenant  $x_0$  tel que quel que soit  $x \in J$ ,  $f(x) \leq f(x_0)$ .



On a un minimum local en  $x_0$  et un maximum local en  $x_1$