


# CERCLES

## 1. Définitions

Le cercle (C) de centre  $\Omega$  de rayon  $r$  est l'ensemble des points  $M$  du plan vérifiant  $\Omega M = r$ .

$$(C) = \{ M / \Omega M = r \}$$

Le cercle de diamètre  $AB$  est l'ensemble des points  $M$  du plan vérifiant  $\vec{AM} \bullet \vec{BM} = 0$



## 2. Équation cartésienne d'un cercle

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Soit (C) le cercle de centre  $\Omega(a ; b)$ , et de rayon  $r$ , et soit  $M(x ; y)$ .

D'après la définition,  $M$  appartient à ce cercle si  $\Omega M = r$ .

Or  $\Omega M = r$  si et seulement si  $\Omega M^2 = r^2$ , donc si et seulement si  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

En développant, on obtient :  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$  : c'est l'équation du cercle.

Si on pose  $c = a^2 + b^2 - r^2$ , l'équation devient :  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ .

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

- Si  $\Omega(a ; b)$  et  $M(x ; y)$ , l'équation cartésienne du cercle (C) de centre  $\Omega$  et de rayon  $r$  a la forme  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ , avec  $c = a^2 + b^2 - r^2$ .
- Réciproquement, l'ensemble des points  $M(x ; y)$  vérifiant  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$  est l'équation d'un cercle de centre  $\Omega(a ; b)$  et de rayon  $r = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$  si  $a^2 + b^2 - c \geq 0$

### Exemple

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1) Déterminer l'équation du cercle (C) de centre  $\Omega(-2 ; 3)$  et de rayon  $r = 4$ .

2) Préciser l'ensemble  $(F) = \{M(x ; y) / x^2 + y^2 - 14x - 6y + 33 = 0\}$

3) Déterminer l'équation cartésienne du cercle ( $\Gamma$ ) de diamètre  $AB$  si  $A(10 ; 7)$  et  $B(4 ; -1)$

### Réponses

1)  $(C) = \{ M / \Omega M = 4 \}$ .  $\Omega M = 4$  si  $\Omega M^2 = 16$ , alors  $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$ .

Après calcul, on trouve : (C) :  $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$

2) Ici  $-2a = -14$  et  $-2b = -6$  et  $c = 33$ .

On trouve  $a = 7$ ,  $b = 3$  donc  $a^2 + b^2 - c = 7^2 + 3^2 - 33 = 25$ .

Alors (F) est le cercle de centre  $\Omega(7 ; 3)$  et de rayon  $r = 5$ .

**Remarque :**

On peut aussi utiliser le début d'un carré pour transformer l'équation :

$$(x + a)^2 - a^2 = x^2 + 2ax \text{ et } (x - a)^2 - a^2 = x^2 - 2ax$$

$$x^2 + y^2 - 14x - 6y + 33 = 0 ,$$

Ce qui équivaut à  $(x^2 - 14x) + (y^2 - 6y) + 33 = 0$

$$(x - 7)^2 - 49 + (y - 3)^2 - 9 + 33 = 0.$$

On obtient  $(x - 7)^2 + (y - 3)^2 = 25$ , ou encore  $\sqrt{(x-7)^2 + (y-3)^2} = 5$

Si on pose  $\Omega(7 ; 3)$  ,  $r = 5$  et  $M(x;y)$ , on obtient la relation  $\Omega M = 5$ .

3)  $M(x ; y) \in (\Gamma)$  si  $\vec{AM} \cdot \vec{BM} = 0$ , c'est-à-dire si  $(x - 10)(x - 4) + (y - 7)(y + 1) = 0$ .

Après calcul, on trouve  $x^2 + y^2 - 14x - 6y + 33 = 0$


Ainsi l'équation du cercle  $(\Gamma)$  est :  $x^2 + y^2 - 14x - 6y + 33 = 0$

### 3. Tangente à un cercle

Le problème est de déterminer une équation cartésienne de la droite  $(T)$  tangente au cercle  $(C)$  au point  $A$  .

Cette droite est perpendiculaire à la droite  $(A\Omega)$  :  $\vec{A\Omega}$  est donc un vecteur normal à cette droite.

$$(T) = \{ M / \vec{M\Omega} \cdot \vec{A\Omega} = 0 \}$$




Exemples :

- Soit  $(C)$  le cercle de centre  $\Omega(2;1)$  et de rayon  $r = \sqrt{2}$  .

1. Montrer que le point  $A(3;0)$  appartient à ce cercle.
2. Tracer ce cercle dans un repère orthonormé.
3. Donner l'équation de la droite  $(T)$  tangente à ce cercle au point  $A$ .
4. Tracer  $(T)$  dans le repère précédent.

**Réponses**

- 1)  $\Omega A = \sqrt{(3-2)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} = r$  . Donc  $A$  appartient à  $(C)$ .
- 2)



3) Un point  $M(x;y)$  appartient à la tangente (T) si  $\vec{\Omega A} \cdot \vec{AM} = 0$  .

On a  $\vec{\Omega A} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{AM} \begin{pmatrix} x-3 \\ y \end{pmatrix}$  .

$\vec{\Omega A} \cdot \vec{AM} = 0$  équivaut à  $1 \cdot (x-3) + (-1)(y+1) = 0$

Ce qui donne  $x-y-4=0$ , ou  $y = x-4$

L'équation réduite de (T) est donc  $y = x-4$

• Soit (C) le cercle d'équation  $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 2$

1. Déterminer le centre et le rayon de ce cercle.

2. Déterminer les coordonnées des points A et B intersection de ce cercle avec l'axe des ordonnées. A est le point dont l'ordonnée est inférieure à celle de B.

3. Tracer ce cercle dans un repère orthonormé.

4. Donner l'équation de la droite (T) tangente à ce cercle au point A et tracer cette droite.

### Réponses

1. Le centre de ce cercle est le point  $\Omega(-1;2)$  , et le rayon  $r = \sqrt{2}$  .

2. Les points d'intersection de ce cercle avec l'axe des ordonnées sont les points de (C) d'abscisses nulles :  $x = 0$ .

En remplaçant  $x$  par 0 dans l'équation, on a  $(0+1)^2 + (y-2)^2 = 2$  ou  $(y-2)^2 = 1$  .

Ce qui donne  $(y-2)^2 - 1 = 0$  , ou  $(y-2-1)(y-2+1) = 0$

Ce qui équivaut à  $y = 3$  ou  $y = 1$ .

Les points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses sont donc A(0;1) et B(0;3).

3. Un point  $M(x;y)$  appartient à la tangente (T) si  $\vec{\Omega A} \cdot \vec{AM} = 0$  .

On a  $\vec{\Omega A} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{AM} \begin{pmatrix} x \\ y-1 \end{pmatrix}$  .

$\vec{\Omega A} \cdot \vec{AM} = 0$  équivaut à  $-1 \cdot x + 2(y-1) = 0$

Ce qui donne  $-x + 2y - 2 = 0$ , ou  $2y = x + 2$

L'équation réduite de (T) est donc  $y = \frac{1}{2}x + 1$

