

IST	AGENTS RESPONSABLES	SYMPTOMES	LES COMPLICATIONS POSSIBLES (A UN STADE TARDIF)	CURABLE	TRAITEMENT
Chlamydirose	Chlamydia trachomatis	Au début, cette infection est souvent asymptomatique. Les symptômes, quand ils apparaissent, sont des fortes douleurs au moment d'uriner (miction douloureuse), des écoulements inhabituels du pénis ou vagin, et les femmes peuvent avoir des saignements entre les règles ou pendant ou après avoir eu un rapport sexuel. Les hommes pourraient avoir mal aux testicules ou des inflammations de testicules.	Non traitée, elle peut entraîner la cécité, la stérilité, une maladie inflammatoire pelvienne et une grossesse ectopique (grossesse extra utérine)	Oui	Antibiotiques
Gonorrhée (la blennorragie, ou gonococcie)	Neisseria gonorrhoeae ou gonocoque (Bactérie)	Au début, cette infection est asymptomatique. Non traitée, on peut détecter les symptômes suivants : ☒ Chez les femmes : des pertes blanches plus épaisses que d'habitude, rougeur et inflammation de la vulve, du vagin et du col de l'utérus, des saignements entre les règles, des brûlures en urinant. ☒ Chez les hommes : urétrite aigue, des brûlures en urinant d'où son nom de chaude pisse et présence de pus à la sortie de l'urètre.	Non traitée, elle peut entraîner une salpingite, une grossesse extra utérine, l'infertilité. L'infection chez une femme enceinte peut entraîner un travail et un accouchement prématurés ainsi qu'une cécité permanente du nouveau-né	Oui	Antibiotiques
Syphilis	Treponema pallidum (Bactérie)	Plusieurs stades d'évolution : Stade primaire : 2 à 3 semaines après la contamination. Apparition de bouton rouge transformé en « chancre » dans les parties génitale, anale ou dans la gorge : plaie non douloureuse et inaperçue, lieu de développement des tréponèmes. Stade secondaire : 2 à 10 semaines après l'apparition du chancre Fièvre, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, perte des cheveux, éruption cutanée sans démangeaison (chancre syphilitique), souvent au niveau de la plante du pied ou de la paume de la main, inflammation des ganglions, et des yeux(rétinite). <i>Les symptômes peuvent apparaitre ou disparaître de façon intermittente pendant plusieurs mois ou plusieurs années mais la maladie est toujours présente de manière latente dans le corps</i> Stade tertiaire : 5 à 30 ans après l'acquisition de l'infection. <u>Problèmes cardio-vasculaires</u> : anévrisme, inflammation de l'aorte. <u>Problèmes neurologiques</u> : surdité, vertige, démence, méningite, cécité, etc. <u>En cas de grossesse</u> : contamination du fœtus , fausse couche, naissance prématurée du bébé ou bébé mort-né	Augmente le risque de contraction de VIH, les mères peuvent transmettre la syphilis au bébé pendant l'accouchement. La syphilis non traitée pourrait éventuellement causer des dégâts au niveau du cerveaux, de l'œil, du foie, des nerfs et pourrait causer la paralysie ou des démences et la mort.	Oui	Antibiotiques
Trichomonase	Trichomonas vaginalis	Les femmes infectées peuvent ne pas avoir de symptôme, mais elles ont parfois une perte (écoulement) vaginale jaune-vert. Chez les hommes, les symptômes ne sont généralement pas présents.	Risque de contracter une autre IST ou un VIH	Oui	Antibiotiques

<p>Herpès génital</p>	<p>Herpès simplex virus-1 (HSV-1) ou Herpès simplex virus-2 (HSV-2)</p>	<p>Apparition de petites vésicules douloureuses, transparentes, remplies de liquide et regroupées entre elles, sur les organes sexuels, accompagnée de maux de tête, de fièvre, de fatigue, de douleurs musculaires, d'une perte d'appétit, et des ganglions enflés à l'aîne. Lorsque ces vésicules se rompent, elles forment de petits ulcères puis des croûtes. Les plaies mettent quelques jours à guérir. Les vésicules sont visibles durant 5 à 10 jours puis disparaissent souvent pour plusieurs mois avant de réapparaître.</p>	<p>Risque élevé de transmission de la mère à l'enfant si elle a été infectée mais non traitée avant la grossesse.</p>	<p>Non</p>	<p>Les médicaments peuvent aider à gérer les éruptions cutanées mais ne guérissent pas l'infection</p>
------------------------------	---	---	---	------------	--