

1 – **VIH** : Virus de l'Immunodéficience Humaine

SIDA : Syndrome d'Immunodéficience Acquise

2 - Un individu est séropositif pour le VIH si après un test de dépistage, son sérum contient des anticorps anti-VIH.

3 – Modes de contamination :

Mode direct :

- ☒ Par voie sexuelle lors d'un rapport sexuel non protégé
- ☒ par échanges d'objets souillés par le virus : seringue, lame rasoir, outils de tatouage.

Mode indirect :

- ☒ Pendant l'allaitement quand la mère est contaminée,
- ☒ Contamination mère – fœtus lors de la gestation

4 – Au début de l'infection, on peut avoir des symptômes généraux qui ressemblent à une forte grippe ou des éruptions cutanées. Ces symptômes peuvent disparaître d'eux-mêmes.

5 – a. Non, il faut faire des analyses sanguines pour détecter la présence du virus.

b. Sans symptômes car le système immunitaire est encore en assez bon état.

6 – On parle d'infection opportuniste quand une infection habituellement non grave le devient chez une personne contaminée et qui présente de très faibles défenses immunitaires.

7 – Protection contre le VIH :

- ☒ Abstinence sexuelle avant le mariage
- ☒ Fidélité dans le couple
- ☒ Utilisation systématique de préservatifs à chaque rapport sexuel.
- ☒ Eviter d'utiliser des objets souillés par le virus.